编者按：2019年7月21日至30日，第51届国际化学奥林匹克竞赛(IChO)在法国巴黎举办。来自全世界80个国家和地区的300名选手参加了这次比赛。经过各5小时的实验和理论考试，共决出196枚奖牌——金牌37枚，银牌64枚，铜牌95枚。中国代表队何流(浙江杭州学军中学)、邓子杰(河北衡水第一中学)、杨景程(湖南长沙市第一中学)、陈劭炎(山东省广饶县第一中学)4名选手发挥出色，获得三金一银的优异成绩。其中，何

流总分第一、实验(满分)与另两位选手并列第一，邓子杰总分第二、理论成绩第一，获得国际纯粹与应用化学联合会设置的特别奖(IUPAC PRIZE)。IUPAC主席、中国化学会监事长周其凤院士应邀参加闭幕式，为选手颁奖。

受中国科协委托，中国化学会委派北京大学化学与分子工程学院裴坚教授担任领队，山东大学化学与化工学院宋其圣教授担任副领队，北京大学化学与分子工程学院王颖霞教授、山东大学化学与化工学院张斌教授作为科学观察员，共同承担比赛期间繁重的试题翻译、试卷评判和分数协调等工作。中国科协青少年科技中心作为全国中学生学科奥林匹克竞赛主管部门，承担着国际奥林匹克学科竞赛中国组委会秘书处的重要职责，中心工作人员曾箴观摩了比赛；中国化学会作为我国化学奥林匹克竞赛的组织单位，委派中国化学会化学竞赛委员会主任北京大学段连运教授观摩比赛并为申办工作提供指导；南开大学朱守非教授、梁广鑫教授和郭东升教授观摩比赛并代表中国化学会向国际化学奥赛组委会提出申请并进行答辩，为我国获得了2022年IChO的举办权。

兹将本届国际化学奥林匹克理论试题及实验试题中文版刊出，以飨读者。为最大程度展示试题原貌，编辑保持试题内容不变，仅对其格式做了少量修改。此外，由于篇幅所限，删除了部分常数列表及答题卡，完整版详见“补充材料”(可通过网站<http://www.dxxh.pku.edu.cn>免费下载)。

第51届国际化学奥林匹克试题(理论部分)

宋其圣¹，张斌¹，朱守非²，郭东升²，梁广鑫²，王颖霞³，裴坚^{3,*}，段连运³

¹ 山东大学化学与化工学院，济南 250100

² 南开大学化学学院，天津 300071

³ 北京大学化学与分子工程学院，北京 100871

The Theory Exam Questions for 51st International Chemical Olympiad

Qisheng Song¹, Bin Zhang¹, Shoufei Zhu², Dongsheng Guo², Guangxin Liang², Yingxia Wang³, Jian Pei^{3,*}, Lianyun Duan³

¹ School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China.

² College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, P. R. China.

³ College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P. R. China.

总则

- 本理论考卷共 58 页。
- “**Start (开始)**” 命令发出后, 即可开始答题。
- 考试时间共 5 小时。
- 所有结果和答案**必须用笔清楚地书写在考卷指定的相应答题框中**。写在答题框外的答案不予评判。
- 若需打草稿, 可以利用试卷的背面。但谨记: 写在指定区域之外的解答不予评判。
- 只能使用提供的笔和计算器。
- 为准确理解题意, 可向监考人员要求提供**英文原版试卷**。
- 若需要离开考场(去洗手间或者饮水、吃零食), 请挥动相应的 IChO 卡, 监考人员将会跟着你。
- 对于多选题的题目: 如果你需要改变答案, 将原方框全部涂黑, 在原框旁边重新画一个方框并做选择。
- 在 “**Stop (停止)**” 命令发出前 30 分钟, 监考人员将给出**提醒**。
- 当 “**Stop (停止)**” 命令发出后, 必须立即停止工作。若不终止书写, 超过半分钟(含)将导致你的理论考试无效。
- 发出 “**Stop (停止)**” 命令后, 将考卷放回考试信封中, 然后在座位上等候。监考人员将封口并收走装有考卷的信封。

目录

本理论考试共有如下 9 道独立的题目。各题所占权重标在括号中。

第 1 题	势阱和丁二烯	(6%)
第 2 题	分解水制氢	(7%)
第 3 题	氯化银的故事	(5%)
第 4 题	从火药到碘的发现	(7%)
第 5 题	用于构建纳米机器的偶氮苯- β -环糊精配合物	(8%)
第 6 题	嵌段共聚物的合成与表征	(8%)
第 7 题	[2]索烃的环内运动	(6%)
第 8 题	肌醇的合成与鉴定	(6%)
第 9 题	左旋布比卡因的合成	(7%)

^1H NMR

与所示官能团连接的氢的化学位移(ppm/TMS)如下:

H—H 耦合常数(Hz)

氢的种类	$ J_{ab} $ (Hz)
$\text{R}_2\text{CH}_a\text{H}_b$	4-20
$\text{R}_2\text{H}_a\text{C}-\text{CR}_2\text{H}_b$	2-12
	如果 σ 键可以自由转动: 6-8
	直立键-直立键(环己烷中): 8-12
	直立键-平伏键或直立键-直立键 (环己烷): 2-5
$\text{R}_2\text{H}_a\text{C}-\text{CR}_2-\text{CR}_2\text{H}_b$	如果 σ 键可以自由转动: < 0.1
	其他(刚性): 1-8
$\text{RH}_a\text{C}=\text{CRH}_b$	顺式: 7-12
	反式: 12-18
$\text{R}_2\text{C}=\text{CH}_a\text{H}_b$	0.5-3
$\text{H}_a(\text{CO})-\text{CR}_2\text{H}_b$	1-3
$\text{RH}_a\text{C}=\text{CR}-\text{CR}_2\text{H}_b$	0.5-2.5

红外 IR 图谱表

振动模式	σ (cm ⁻¹)	峰的强度
醇 O—H (拉伸 stretching)	3600–3200	强
羧酸 O—H (拉伸 stretching)	3600–2500	强
N—H (拉伸)	3500–3350	强
≡C—H (拉伸 stretching)	3300	强
=C—H (拉伸 stretching)	3100–3000	弱
C—H (拉伸 stretching)	2950–2840	弱
—(CO)—H (拉伸 stretching)	2900–2800	弱
C≡N (拉伸 stretching)	2250	强
C=C (拉伸 stretching)	2260–2100	易变
醛 C=O (拉伸 stretching)	1740–1720	强
酸酐 C=O (拉伸 stretching)	1840–1800; 1780–1740	弱; 强
酯 C=O (拉伸 stretching)	1750–1720	强
酮 C=O (拉伸 stretching)	1745–1715	强
酰胺 C=O (拉伸 stretching)	1700–1500	强
烯烃 C=C (拉伸 stretching)	1680–1600	弱
芳环中的 C=C (拉伸 stretching)	1600–1400	弱
CH ₂ (弯折 bending)	1480–1440	中等
CH ₃ (弯折 bending)	1465–1440; 1390–1365	中等
C—O—C (拉伸 stretching)	1250–1050	强
C—OH (拉伸 stretching)	1200–1020	强
NO ₂ (拉伸 stretching)	1600–1500; 1400–1300	强

第 1 题 6%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
	分数	3	4	4	2	3	2	2	4.5	2.5	3	3	33
	得分												

第 1 题 势阱与丁二烯

1,3-丁二烯分子常写作 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$, 显示有单双键交替。但是, 其化学反应性与此描述并不相符, 更合适的表示方式是将 π 电子分布在三个键上:

这一体系可以用一维箱(也就是势阱)中的自由电子模型处理。在长度为 L 的一维势阱中, 一个电子的能量可以用如下公式确定: $E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2}$, 其中, n 为正整数。

1) 研究两种不同的模型。对每一种模型, 在其对应的图中画出至少三个最低能级 E_n , 示出能级相对高低(图内和图间均应有可比性)。

模型 1: π 电子定域在两头的双键上, 形成两个分立的长度为 d 的势阱;

模型 2: π 电子离域在整个分子中, 形成单一的长度为 $3d$ 的势阱

2) 将 π 电子排布在上述示意图之模型 1 的轨道中, 写出模型 1 中 π 电子体系总能量的表达式, 含参数 h 、 m_e 和 d 。

3) 将 π 电子排布在上述示意图之模型 2 的轨道中, 写出模型 2 中 π 电子体系总能量的表达式, 含参数 h 、 m_e 和 d 。

共振能等于实际 π 体系的总能量减去乙烯分子(具有相同数目的电子)能量之和的差值。

4) 写出丁二烯共振能 ΔE_c 的表达式, 含参数 h 、 m_e 和 d 。

模型 1 和 2 都过于简单。下面给出一个更细致的新模型。

5) 采用 Lewis 结构, 参照化学式 $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$, 画出丁二烯的另外三种共振式。

考虑到碳原子有一定的大小, 模型 2 可以修正为模型 3, 处理如下: 新的势阱长度为 L , 对应于横轴在 0 到 L 之间; 碳原子分别处于横坐标的 $L/8$ 、 $3L/8$ 、 $5L/8$ 以及 $7L/8$ 处。

对每一能级 n , π 电子波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

对于含有 N 个 π 电子的体系, π 电子密度为:

$$\rho(x) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\psi_i(x)|^2$$

与 π 体系的分子轨道相对应, 4 个 π 波函数示意图如下(次序任意):

- 6) 排出 4 个 π 轨道的能量次序(E_A 、 E_B 、 E_C 和 E_D)。
- 7) 写出 丁二烯中电子占据轨道所对应的符号(A、B、C 或 D)。
- 8) 采用模型 3, 对于已占能级 $n=1$ 和 $n=2$, 算出 在位置 0 、 $L/4$ 和 $L/2$ 处, π 波函数含参数 L 的表达式。
- 9) 采用模型 3, 算出 在位置 0 、 $L/4$ 和 $L/2$ 处, π 电子的密度。
- 10) 画出 $0-L$ 之间电子密度的变化。

- 11) 排出 如下 CC 键 (B1、B2、...、B5) 键长的次序, 采用 $=$ 或者 $<$, 按照升序排列:
- B1: 丁二烯分子中 C1C2 之间的键
- B2: 丁二烯分子中 C2C3 之间的键
- B3: 丁二烯分子中 C3C4 之间的键
- B4: 乙烷分子中的 CC 键
- B5: 乙烯分子中的 CC 键

第 2 题 7%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
	分数	1	4	2	3	3	6	4	1	8	2	34
	得分											

第 2 题 分解水制氢

数据如下:

物质	$H_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$	$O_2(g)$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol $^{-1}$)	0	-285.8	-241.8	0
S_m° (J mol $^{-1}$ K $^{-1}$)	130.6	69.9	188.7	205.2

氢气(H_2)可用作排放二氧化碳的燃料的替代品。因此, 降低其生产成本和环境影响是一个重大挑战。在这一领域, 分解水制氢是一种有前景的可选技术。

- 1) 写出 液态水分解反应的方程式并配平, 要求水的计量系数为 1。
- 2) 仅采用所给热力学数据, 通过计算数据判断, 298 K 时该反应在热力学上能否自发进行?

分解水通过电化学过程进行, 在装有酸性水溶液的电解池中, 插入两个电极, 电极连接外电源, 两个电极上均有气泡产生, 如图 1 所示。

- 3) 写出 各电极上发生的电化学反应方程式并配平。
- 4) 仅采用所给热力学数据(或小题 2 的结果), 计算 298 K 下, 加在

图 1 水分解的电解池

两电极之间的实际电压($\Delta E_{\text{applied}}$)和要使反应在热力学上可行所需分解电压 ΔE_{th} (待定)的关系, 设反应物和产物都处于标准态。勾选正确的条件, ΔE_{th} 计算结果中小数点后保留 3 位数字。

☐ $\Delta E_{\text{applied}} = \Delta E_{\text{th}}$

☐ $\Delta E_{\text{applied}} > \Delta E_{\text{th}}$

☐ $\Delta E_{\text{applied}} < \Delta E_{\text{th}}$

如果未能计算出 ΔE_{th} , 后续题目可以使用 1.200 V。

实验中, 需要施加更高的电压才能实现水的分解。若采用 Pt 做阴极, 分解水所需的最小电压 ΔE_{min} 取决于阳极的性质, 下表列出几种阳极材料:

阳极	$\Delta E_{\text{min}}(\text{V})$
IrO _x	1.6
NiO _x	1.7
CoO _x	1.7
Fe ₂ O ₃	1.9

ΔE_{min} 和 ΔE_{th} 的差值源于电解池的损耗。

5) 写出含参数 ΔE_{th} 和 ΔE_{min} 的电解池功效 η_{elec} 的函数表达式(即水分解中功率的比值)。假设电流值保持一致, 计算采用 Pt 做阴极、Fe₂O₃ 做阳极时, 电解水的功效。选出最有效的阳极。如果未能计算出 η_{elec} , 后续题目使用 $\eta_{\text{elec}} = 75\%$ 。

另一种替代方法是直接光催化分解水, 该过程用到可以吸光而被激活的半导体材料。

6) 估算可以激活半导体 TiO₂、CdS、Si 的太阳光子通量分数(参考图 2)。明确示出用于计算的公式和单位。

图 2 太阳光子通量 ϕ 的光谱分布

光子通量是指单位时间到达半导体单位面积上的光子数;

右轴和虚线: 累积光子通量(即包含波长较短的光子通量的分数)

半导体的激活导致表面电位的改变, 因此它可以看作是有不同电位的两个电极。

7) 采用图 3 的数据, 在下面选出哪些半导体激活后同时可用作阳极和阴极而促使水分解的材料。

☐ ZrO₂ ☐ ZnO ☐ TiO₂ ☐ WO₃ ☐ CdS ☐ Fe₂O₃ ☐ CdSe ☐ Si

8) 选出可同时用作阳极和阴极, 并在给定太阳光照射下分解水效率最高的半导体。

图3 不同半导体的激活条件及等效电极电势

虚线分别对应水的氧化和还原电势。SHE = 标准氢电极

近来,有人开展了在 $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及大气压 p_{atm} 下,半导体在模拟太阳光照射下析出 H_2 和 O_2 的研究工作。当光入射功率 $P = 1.0\text{ kW m}^{-2}$,光电极表面积 $S = 16\text{ mm}^2$,反应1小时后可以收集到 $V = 0.37\text{ cm}^3$ 的氢气。

9) **计算**光转化功效 η_{direct} 。如果未算出 η_{direct} ,在后续题目中使用 $\eta_{\text{direct}} = 10\%$ 。

对两种太阳能转化制氢的模式进行比较:一种是直接光催化分解,一种是将光伏板和电解槽相组合的间接光电解。市售光伏板的功率约为 $\eta_{\text{panels}} = 20\%$ 。

10) **比较**两种模式的功效, η_{direct} 和 η_{indirect} , 设用 Fe_2O_3 和 Pt 作电极进行电解。

☐ $\eta_{\text{direct}} > \eta_{\text{indirect}}$

☐ $\eta_{\text{direct}} \approx \eta_{\text{indirect}}$

☐ $\eta_{\text{direct}} < \eta_{\text{indirect}}$

第3题 5%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
	分数	1	3	3	3	4	2	7	2	2	3	4	6	40
	得分													

第3题 氯化银的故事

298 K, 有关数据如下:

$\text{p}K_{\text{s1}}(\text{AgCl}) = 9.7$; $\text{p}K_{\text{s2}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 12$;

配合物 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+$ 的形成常数: $\beta_n = 10^{7.2}$;

相对于标准氢电极的电势:

$\text{Ag}^+/\text{Ag}(\text{s})$ 的标准电极电势: $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}(\text{s})) = 0.80\text{ V}$

$\text{O}_2(\text{aq})/\text{HO}^-(\text{aq})$ (海水) 的条件电势: $E'(\text{O}_2(\text{aq})/\text{HO}^-(\text{aq})) = 0.75\text{ V}$

Part A: 引用自盖-吕萨克(Louis-Joseph Gay-Lussac)的化学课

盖-吕萨克(Louis-Joseph Gay-Lussac, 1778–1850), 法国化学家和物理学家。下面关于氯化银某些性质的叙述引自其化学课。

引述 A: “来说说氯化银, 一种乳白色的固体。将盐酸加入硝酸银水溶液即可得到它。”

引述 B: “由于它不溶于水, 这种盐没有味道。”

引述 C: “这种化合物完全不溶于乙醇甚至酸, 却可溶解于浓盐酸。”

引述 D: “另一方面, 氯化银在氨水中高度可溶。”

引述 E: “然后, 通过加入酸, 其与氨水反应后, 我们可以让氯化银重新出现。”

引述 F: “如果你用一个银碗蒸发成海水, 得到的氯化钠不纯, 掺有一种乳白色固体。”

1) 引述 A: 写出合成 AgCl(s) 的化学方程式并配平。

2) 引述 B: 计算 298 K 时, AgCl(s) 在水中的溶解度(单位: mol L^{-1})。

3) 引述 C: 在高浓度氯离子溶液中, 可以生成化学计量比确定为 1 : 2 的配合物。在下面数轴上(从左向右 pCl 值增加)的每个区域, 定性写入各区域银物种的主要存在形式(含固体)。交界处的 pCl 值不用考虑。

引述 D: 当把氨水加入到 AgCl 中时, 生成了一种化学计量比确定为 n 的配合物。

4) 写出从 AgCl 合成配合物 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+$ 的方程式并配平, 计算对应的平衡常数。如果你没能算出 K 值, 后面处理中可使用 $K = 10^{-3}$ 。

5) 向含有 0.1 mol AgCl 的 1 L 水中加入氨水, 当最后的固体颗粒恰好消失时, $[\text{NH}_3] = 1.78 \text{ mol L}^{-1}$ 。计算配合物的化学计量比 (忽略稀释效应)。

6) 写出引述 E 中的化学方程式并配平。

7) 假设海水为弱碱性且富含氧气, 在此条件下银金属可以还原氧气分子。写出引述 F 中提到的此条件下生成的乳白色固体的化学方程式并配平(氧气的化学计量数取为 1), 计算该反应在 298 K 的平衡常数。

Part B: 莫尔(Mohr)法

莫尔(Mohr)法是在铬酸钾(2K^+ , CrO_4^{2-})存在下, 用 Ag^+ 作为滴定剂对 Cl^- 进行的显色滴定。向体积 $V_0 = 20.00 \text{ mL}$ 的未知浓度氯化钠 C_{Cl} 溶液中, 加入三滴(约 0.5 mL)浓度约为 $7.76 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ 的 K_2CrO_4 溶液。采用 $\text{C}_{\text{Ag}} = 0.050 \text{ mol L}^{-1}$ 的硝酸银溶液(Ag^+ , NO_3^-)滴定上述氯化钠溶液, 即可生成固体 A, 当 $V_{\text{Ag}} = 4.30 \text{ mL}$ 时溶液中出现红色沉淀(固体 B)。

8) 写出实验中发生的两个化学反应方程式并配平。计算其分别对应的平衡常数。

9) 判断两种固体 A 和 B。

10) 计算氯化钠溶液中未知氯离子的分析浓度 C_{Cl} 。如果你未能计算出 C_{Cl} , 后面的问题中可以使用 $\text{C}_{\text{Cl}} = 0.010 \text{ mol L}^{-1}$ 。

11) 计算 AgCl(s) 沉淀开始生成时所需的最少体积 $V_{\text{Ag}}(\text{min})$ 。

12) 计算当 Ag_2CrO_4 沉淀刚生成时, 溶液中剩余的氯离子浓度 $[\text{Cl}^-]_{\text{res}}$ 。通过两个数值的比较, 评价为什么 CrO_4^{2-} 是一个很好的滴定终点指示剂。

第 4 题 7%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
	分数	6	9	8	5	6	2	2	12	50
	得分									

第 4 题 从火药到碘的发现

19 世纪, 法国企业家 B. Courtois 专门生产用于制造火药的硝酸盐 A ($\text{M}_\text{A}(\text{NO}_3)_m$)。A 最初从亚洲进口, 后来由硝酸盐 B ($\text{M}_\text{B}(\text{NO}_3)_n$)与藻类中的化合物 C 进行置换反应而制得。

1) 确定硝酸盐 A 和 B 的化学式。二者是碱金属或碱土金属(M_A 和 M_B)的无水硝酸盐, 其中一

种硝酸盐含有不超过 1 w% 的非金属杂质, 而另一种则含有 9 ± 3 w% 的杂质。样品中金属 M_A 和 M_B 的含量分别为 38.4 w% 和 22.4 w%。通过**计算**给出答案。

为了获得 **A**, 将 262.2 g 固体化合物 **C** 加入含有 442.8 g **B** (已知 **B** 过量) 的溶液中, 结果生成 190.0 g 白色沉淀 **D**, 过滤除去沉淀 **D**。蒸干滤液, 并加热所得固体混合物 **E**, 直到样品 (仅含亚硝酸盐, NO_2^-) 质量恒定。仅有的气体产物为氧气, 其在 0°C 、1 大气压时体积为 60.48 L (氧气可视为理想气体)。

2) **计算**混合物 **E** 的组成(w%)。**E** 中只含化合物 **A** 和 **B**, 无其他杂质。所用的 **C** 为无水纯净物。

3) **确定**化合物 **C** 和 **D** 的化学式, **写出****B** 和 **C** 反应的方程式并配平。

1811 年, 在处理藻灰时, Courtois 观察到铜容器的损耗速度比平时快。当他正在研究此现象时, 他的猫闯进了实验室, 打翻的浓硫酸溶液溅到干藻灰上, 随即从容器中冒出紫色蒸气(**1**, 此反应中硫酸是氧化剂): 碘(I_2)由此而得以发现! 正是碘引起了铜的腐蚀(**2**)。此后, 由于碘在医学上的用途, Courtois 开辟了一个新的制造业: 通过藻类与氯反应来生产碘(**3**)。

今天, 碘主要通过反应体系(NO_3^- 、 I^- 、 H^+) (**4**)或(IO_3^- 、 I^- 、 H^+) (**5**)来制备。

4) **写出****1-5** 的反应方程式并配平。

碘在水中的溶解度很低, 但若加入碘离子, 其溶解度将显著增加。它们一起形成三聚离子 I_3^- :

通过二氯甲烷萃取 I_2 可以研究平衡(**6**)。实际上, I^- 和 I_3^- 难溶于有机溶剂, 但 I_2 易溶。萃取时, I_2 在二氯甲烷中的浓度是水中浓度的 15 倍。

进行如下实验: 将少量碘晶体溶解于 50 mL 含有 0.1112 g 碘化钾的水溶液中, 配得初始溶液。然后, 加入 50 mL 二氯甲烷, 充分振荡混合溶液直到平衡。分相后, 以淀粉为指示剂, 用五水合硫代硫酸钠的标准溶液(1.000 L 溶液中含 14.9080 g)分别滴定, 有机相消耗 16.20 mL, 水相消耗 8.00 mL 硫代硫酸钠溶液。整个实验流程示于下图:

5) **找出**步骤(**1-9**)所得体系与代表它们的示意图(**a-i**)之间的对应关系。

6) **写出**滴定过程中碘物种和硫代硫酸钠发生反应的两个可能的化学方程式并配平。

7) **计算**配制初始碘溶液所需碘的质量。

8) **计算**反应(**6**)的平衡常数 K° 。

第 5 题 8%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
	分数	3	4	4	2	5	5	4	3	5	2	2	2	41
	得分													

第 5 题 用于构建纳米机器的偶氮苯- β -环糊精包合物

纳米机器是一种可将能源转变为纳米运动的分子组装体，可应用于药物传输等领域。多种纳米机器利用了偶氮化合物($R-N=N-R'$)经光照而发生的异构化反应。

1) 画出偶氮苯($H_5C_6-N=N-C_6H_5$)的立体异构体，在距离最远的两个碳原子之间画出一条直线，比较两个距离(d_{trans} 和 d_{cis})的长短。

2) **M** 可以通过简单的反应物(图 1)经两步反应合成。从图 1 给出的化合物中(**N** to **Q**)，选出可以高度区域选择性制备 **M** 的反应底物。溶于冷盐酸的亚硝酸钠($NaNO_2$)用作合成步骤中的第一步反应试剂。

图 1 合成 **M** 的可能反应物

结合常数 K_t 的测定

β -环糊精(**C**，见图 2)是一种葡萄糖的环七聚体，可以与偶氮类化合物形成包合物。在本题的 3–6 小题中，我们将通过光谱法测定如图 2 所示包合物 **CM_{trans}** 的结合常数 K_t 。

图 2 包合物 **CM_{trans}** 的形成

配制数种 **C** 和 **M_{trans}** 比例不同的混合溶液，二者起始浓度分别为 $[C]_0$ 和 $[M_{trans}]_0$ 。所配溶液均具有相同的 $[M_{trans}]_0$ ，只是 $[C]_0$ 有变化。在固定波长下，测定所得各溶液的吸光度与纯 **M_{trans}** 溶液吸光度的差值 ΔA ，将 **CM_{trans}** 和 **M_{trans}** 的摩尔吸光系数分别写作 $\epsilon_{CM_{trans}}$ 和 $\epsilon_{M_{trans}}$ 。 L 为光源通过样品的光程， β -环糊精 **C** (ϵ_C) 的吸收可忽略。

3) 证明： $\Delta A = \alpha \cdot [CM_{trans}]$ ，写出 α 的表达式(含一个或多个已知常数)。

4) 证明：当 **C** 大大过量于 **M_{trans}** 时(即， $[C]_0 \gg [M_{trans}]_0$)，**C** 的浓度可以看作常数，即 $[C] \approx [C]_0$ 。

5) 证明：当 **C** 大大过量于 **M_{trans}** 时(即， $[C]_0 \gg [M_{trans}]_0$)， $\Delta A = \alpha \cdot \frac{\beta \cdot [C]_0}{1 + K_t \cdot [C]_0}$ ；写出 β 的表达式(含常数和初始浓度)。

6) 利用如下实验曲线(图 3)，计算 K_t 值。

图3 $1/\Delta A$ 随 $1/[C]_0$ 的变化关系

结合常数 K_c 的测定

在如下 7-9 小题中, 将通过动力学方法研究 M_{cis} 及其包合物 CM_{cis} 的形成, 测定结合常数 K_c 。照射仅含有 M_{trans} 的样品会生成已知量的 M_{cis} , 其浓度为 $[M_{cis}]_0$ 。 M_{cis} (游离或存在于包合物内) 发生热异构转化为 M_{trans} 。当不存在 C 时, 异构化反应按照一级动力学进行, 其速率常数为 k_1 。所有的包合反应平衡都快于异构化反应过程。图 4 为这个实验的动力学反应示意图。

图4 C 存在下 M_{cis} 异构化反应的动力学机制示意图

总 M_{cis} (游离和包合物中的) 的转化速率定义为:

$$r = k_1[M_{cis}] + k_2[CM_{cis}]$$

实验中, r 遵循一级动力学反应规律, 其表观速率常数为 k_{obs} :

$$r = k_{obs}([M_{cis}] + [CM_{cis}])$$

7) 证明: $k_{obs} = \frac{\gamma + \delta \cdot k_2[C]}{1 + K_c[C]}$, 写出 γ 和 δ 的表达式(含已知常数)。

8) 若 $[C]_0 \gg [M_{cis}]_0$, 在下面方框内选择在怎样的条件(单选或多选)下, 对应于 k_{obs} 的半衰期 $t_{1/2}$ 可以表达为 $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma}(1 + K_c[C]_0)$ 。推导证明你的结论。

- ☐ 环糊精内 M_{cis} 的异构反应很慢
- ☐ 游离 M_{cis} 的异构反应很慢
- ☐ CM_{cis} 很稳定
- ☐ CM_{trans} 很稳定

9) 若第 8 小题中的条件均得以满足, 对下表中列出的数据进行线性回归, 确定 K_c 值。可使用计算器或采用作图法。

$[C]_0/(\text{mol L}^{-1})$	$t_{1/2}/\text{s}$	$[C]_0/(\text{mol L}^{-1})$	$t_{1/2}/\text{s}$
0	3.0	$3.0 \cdot 10^{-3}$	5.9
$1.0 \cdot 10^{-4}$	3.2	$5.0 \cdot 10^{-3}$	7.7
$5.0 \cdot 10^{-4}$	3.6	$7.5 \cdot 10^{-3}$	9.9
$1.0 \cdot 10^{-3}$	4.1	$1.0 \cdot 10^{-2}$	12.6

纳米机器的构建

将另外一种初始为反式结构的偶氮苯化合物(其 $K_c \ll K_t$)共价连接到硅胶表面(如图 5 所示)。在硅胶孔内充入一种染料(罗丹明 B, 图 5 中的灰色圆点)。通过加入 C 而形成的包合物封住硅胶孔, 阻止染料的释放。

图 5 通过光激发异构化反应导致偶氮苯-环糊精包合物的解离应用于染料分子(灰色圆点)传输

10) 选择最适合条件(单选), 使得在 C 存在的条件下, 开始可以封住硅胶孔, 而在照射条件下可以释放染料。

- ☐ $K_t \gg 1$
- ☐ $K_t \gg 1$ 且 $K_c \ll 1$
- ☐ $K_t / K_c \ll 1$
- ☐ $K_t \gg 1$ 且 $K_c \gg 1$
- ☐ $K_c \ll 1$

将内含染料的偶氮苯-硅胶粉末放置在比色皿内的一个角落(图 6), 这样粉末不会扩散到溶液中。该粉末在波长 λ_1 的照射下可启动染料从硅胶孔中的释放(图 5)。通过吸收光谱测量溶液在波长 λ_2 的吸光度而监测染料的释放。

- 11) 确定 λ_1 。
- 12) 确定 λ_2 。

图6 监测染料释放的实验装置(左)及反式偶氮苯(实线)、顺式偶氮苯(点线)和罗丹明 B(虚线)的吸收光谱(右)

第6题 8%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
	分数	4	4	5	3	10	2	9	6	5	48
	得分										

第6题 嵌段共聚物的表征

由不同聚合物片段(嵌段)连接而成的嵌段共聚物具有独特的性质,例如,自组装能力。此题研究了嵌段共聚物的合成和表征方法。

第一个片段的研究

在第一部分,我们将研究水溶性聚合物 **1** (α -甲氧基- ω -氨基聚乙二醇)。聚合物 **1** 的 ^1H NMR 谱图(DMSO- d_6 , 60 °C, 500 MHz)中包括以下信号峰:

表 1*

Index	δ (ppm)	积分面积
a	2.7*	0.6
b	3.3	0.9
c	3.4	0.6
d	~3.5	133.7

*加入 D_2O 后,化学位移 2.7 ppm 的信号峰将会消失

1) 将表 1 中的 ^1H NMR 谱图的信号峰(a、b、c、d)填入到与其相对应的框中。

2) 平均聚合度 n 为聚合物重复单元 OC_2H_4 的链节数与末端甲基之比, OC_2H_4 的链节数可以根据其 NMR 信号峰面积 $A_{\text{OC}_2\text{H}_4}$ 与端基 OCH_3 的 NMR 信号峰面积 A_{OCH_3} 比较所得。计算 n 。如果你无法算出 n 值, 就在后续计算中假定 $n = 100$ 。

双嵌段共聚物的研究

通过 **1** 与 **2** (ϵ -(苄氧基羰基)-赖氨酸 N -酸酐) 反应来合成第二个嵌段共聚物, 得到了嵌段共聚物 **3**。

3) 画出 **1** 对 **2** 加成反应所形成的第一个中间体的结构式。按照反应机理, 接下来将生成一个气体分子 **G**。写出此气体分子的结构式。

4) 红外光谱(IR) 可用于表征这些化合物。在右框中选择与左边红外光谱相符的化合物 **1**、**2** 或 **3**。

化合物:

☐ **1** ☐ **2** ☐ **3**

化合物:

☐ **1** ☐ **2** ☐ **3**

化合物:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

5) 图1展示了共聚物 **3** (DMSO- d_6 , 60 °C, 500 MHz) 的 ^1H NMR 谱图。利用小题2中计算所得的 n 值, 和部分或全部核磁共振信号的积分面积(如表2所示), 计算3 的数量平均摩尔质量 M_n 。为便于计算, 在下图分子上圈出你用于计算的原子或原子团, 并用表2中对应的符号($\alpha, \beta, \dots$)标示。

表2

信号峰	面积
α	22.4
β	119
γ	23.8
δ	47.6
ϵ	622

图1 标有*的信号峰对应于用于核磁共振测定的溶剂和所含的水

1 与 **2** 在 40 °C 下反应 20 h 后生成共聚物 **3a**, 25 h 后生成 **3b**, 反应 30 h 后生成 **3c**。图2展示了这些聚合物的尺寸排除色谱(SEC)的测定结果。

图2 **3a**、**3b** 和 **3c** 的 SEC 色谱图与洗脱液体积 V_e 的关系图

6) 在以下空格中划出哪一曲线对应于共聚物 **3a**、**3b** 或 **3c**。

3a: ☐ X ☐ Y ☐ Z

3b: ☐ X ☐ Y ☐ Z

3c: ☐ X ☐ Y ☐ Z

可以利用已知质量(3、30、130、700、以及 7000 kg mol⁻¹)的标准聚合物的混合物校准 SEC (图 3)。
摩尔质量的对数与洗脱液体积 V_e 成线性关系。

图 3 标准混合物的 SEC 图

7) 根据图 2 和图 3 中的 SEC 曲线，确定对应于曲线 X 的聚合物的 V_e ，并用它来估算其第二片段的聚合度 m 。列出具体的计算过程；你可以使用计算器或绘制图表。

三嵌段共聚物的合成

为了胶束形成等在生物学方面应用，可通过利用单体 **5** 引入中间片段 **B**，合成三嵌段共聚物 **9**。

catalyst: 催化剂

8) 画出化合物 **5**、**7** 和 **8** 的结构式。(提示: **5** (除了化合物 **6: A-B** 外, 没有再生成其他化合物; **7** (最后一步会生成一种气体))

9) 两亲性三嵌段共聚物, 如 **9: A-B-C**, 可应用于医疗, 因为它们在水中可以自组装形成胶束 (pH = 7), 从而用于药物载体。将共聚物的每个片段归属于一个属性。画一个只由图中 4 条聚合链组装而成的胶束图。

A: ☐ hydrophobic 疏水

☐ hydrophilic 亲水

B: ☐ hydrophobic 疏水

☐ hydrophilic 亲水

C: ☐ hydrophobic 疏水

☐ hydrophilic 亲水

A B C

第 7 题 6%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
	分数	4	12	2	2	2	5	5	8	4	5	5	54
	得分												

第 7 题 [2]索烃分子中环的运动

2016 年, 诺贝尔化学奖授予了 J.-P. 索维奇(J.-P. Sauvage)、J. F. 斯托达特爵士(Sir J. F. Stoddart)和 B. L. 费林加(B. L. Feringa), 以表彰他们对“设计和合成分子机器”的贡献。其中的一个例子是[2]索烃, 一种由两个环互锁而形成的分子。在这个体系中, 一个大环包含一个邻菲罗啉配体(双齿配体), 第二个大环则包含两个配体: 邻菲罗啉和三联吡啶(三齿)。铜离子可与每个大环中的一个配体配位。依赖于铜的氧化态(+I 或+II), 可以得到两种不同构型的配位物(图 1)。

图 1 [2]索烃中环的多稳定性

大环 I 合成方法如下:

- 1) 画出 B 的结构式。
- 2) 画出 E、F 以及 G 的结构式。
- 3) 从以下反应条件中, 选出哪一种条件可以使 D 转化为 E。

- ☐ H^+ , H_2O
- ☐ OH^- , H_2O
- ☐ NaBH_4 , CH_3OH
- ☐ H_2 , Pd/C , THF

4) 在合成策略中, MsCl 的作用是获得:

- ☐ 一个离去基团
- ☐ 一个保护基团
- ☐ 一个钝化基团
- ☐ 一个定位基团

5) **G** 可由 **F** 和 LiBr 在丙酮中反应得到。这个反应属于:

- ☐ 芳香亲电取代反应
- ☐ 芳香亲核取代反应
- ☐ $\text{S}_{\text{N}}1$
- ☐ $\text{S}_{\text{N}}2$

6) 画出 **F** $\rightarrow$ **G** 反应中与决速步相关的过渡态, 示出立体几何。只须给出一个反应中心。与反应碳原子连接的碳链可以用 **R** 表示。

利用铜配合物的模板作用合成[2]索烃 **L**:

7) 写出基态 $\text{Cu}(0)$ 完整的核外电子构型。指出 Cu 在配合物 **J** 中的氧化态, 并写出其对应的自由离子的核外电子构型。

8) 勾选铜离子在 **L** 中的几何构型。假设配体以理想几何围绕着铜中心, 画出 d 轨道在相应晶体场中的能级分裂图, 填入 电子。指出该配合物中电子自旋的最大值(S)。

铜离子在 **L** 中的几何构型为:

- ☐ 八面体
- ☐ 四面体
- ☐ 平面四边形
- ☐ 三角双锥

9) 以下化合物中, 哪些可以与 **L** 中铜配位将 **L** 转化为无配位的[2]索烃:

- ☐ CH_3CN
☐ NH_4PF_6
☐ KCN
☐ tren

在[2]索烃 **L** 中, 铜离子可以有(+I) 或 (+II)两种氧化态, 且二者处于不同的配位环境中(分别为四配位或者五配位)。

Cu(I) 配合物的稳定性可由其电子结构与稀有气体关联而得以解释。

10) 在空白处填写数字或在框中打勾:

Cu(I)N_4 配合物中, 金属在配位场中有 ... 个电子。

Cu(I)N_5 配合物中, 金属在配位场中有 ... 个电子。

和配合物 Cu(I)N_5 相比, 配合物 Cu(I)N_4 ☐ 更(more)稳定或者 ☐ 更(less)不稳定。

11) 在实线框中填写曾在图 2 中出现过的配合物的简式。在虚线框中, 填入如下记号: (转动)、 $+\text{e}^-$ 或 $-\text{e}^-$, 从而完成如下转化图, 实现分子机器系统的电化学控制。

第 8 题 6%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	总分
	分数	2	6	2	2	11	2	4	3	4	2	6	8	2	6	4	64
	得分																

第 8 题 肌醇的合成与鉴定

在此题中，我们依据以下所示的 β -葡萄糖结构定义“立体结构”(3D structure)和“透视式”(perspective formula)。

肌醇为环己-1,2,3,4,5,6-六醇。某些六元碳环化合物，尤其是 *myo*-肌醇，常参与许多生物学过程。

myo-肌醇的结构

1) 画出肌醇的结构式，无须示出具体的立体化学。

这个分子包含了 9 种包括对映体在内的不同的立体异构体。

2) 画出所有具有光学活性的立体异构体的立体结构。

此题研究了一种特殊肌醇，即 *myo*-肌醇的结构。*myo*-肌醇只有一个椅式构象为优势构象，可以从 ^1H NMR 谱中推断其具体结构。以下谱图是以 D_2O 为溶剂在 600 MHz 核磁共振仪上得到的。在该谱图中没有观察到该化合物的其他信号。积分面积值展示在每个信号峰下面。

3) 画出该 ^1H NMR 测试样品中 *myo*-肌醇在 D_2O 溶剂中的主要化合物分子式，该分子式须与核磁共振氢谱中观察到的氢数目一致。

4) 基于氢信号峰的数量和积分面积值，判断此分子中有几个对称面。

5) 依据 *myo*-肌醇最稳定的构象，在以下透视式中的直立键和平伏键上画出相应的基团。然后根据上面的 NMR 谱图，用相应的字母(a, b, c 或 d) 标记每一种氢。如，氢 a 必须在下图所示的碳 a 上。画出其立体结构。

立体结构:

肌醇的合成

为了医学上的应用,肌醇常作为原料用于大量合成一些肌醇磷酸盐。我们将研究以溴代二醇 **1** 为原料合成肌醇 **2**。

6) 化合物 **2** 与 **3** 的结构之间的准确关系为:

- ☐ 对映异构体
- ☐ 差向异构体
- ☐ 非对映异构体
- ☐ 位阻异构体

以化合物 **1** 为原料经 7 步反应可以合成肌醇 **2**。

Acetone: 丙酮; aq: 水溶液

7) 画出化合物 **4** 的立体结构。

8) 生成化合物 **5** 的反应须发生在电子云密度高的双键上。根据以下化合物 **4** 的替代结构，在 1-溴-1,3-环己二烯的结构式中圈出具有电子云密度高的双键，并再画两个相同的结构式，在这些结构式上分别明确表示出由于溴取代后产生的电子效应。

9) 画出非对映异构体主产物 **5** 的立体结构。

10) 以对映体纯的化合物 **1** 为原料，经此合成路线，可以得到总共多少个化合物 **5** 的立体异构体？

11) 在由 **5** 转化为 **6** 的这步反应中，还生成了另一个具有相同分子式的化合物 **6'**。画出 **6** 和 **6'** 的立体结构。

12) 画出非对映异构体主产物 **8** 和 **9** 的立体结构。

13) 合成 **2** 的最合适反应条件 **A** 为：

- ☐ H₂, Pd/C
- ☐ K₂CO₃, HF
- ☐ HCOOH, H₂O
- ☐ BF₃·OEt₂

14) 如果化合物 **1** 中没有溴取代基，除了得到 **2** 外，还可以得到另一个立体异构体。考虑到合成过程中反应的立体选择性保持不变，并且后续步骤保持与合成 **2** 一致的当量数，画出该立体异构体的立体结构，并判断其与 **2** 的关系。

- ☐ enantiomers 对映异构体
- ☐ epimers 差向异构体
- ☐ diastereoisomers 非对映异构体
- ☐ atropoisomers 位阻异构体

15) 在由 **1** 合成 **2** 的过程中，以下哪些步骤属于保护基或反应中起导向作用的基团的脱除反应？

- ☐ **1** → **4**
- ☐ **4** → **5**
- ☐ **5** → **6**
- ☐ **6** → **7**
- ☐ **7** → **8**
- ☐ **8** → **9**
- ☐ **9** → **2**

第 9 题 7%	小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	总分
	分数	2	2	4	3	2	17	1	1	2	4	2	2	2	44
	得分														

第 9 题 左旋布比卡因(levobupivacaine)的合成

第 I 部分

局部麻醉剂布比卡因(市场上为 Marcaine)属于世界卫生组织的基本药物名录。尽管此药物常以消旋混合物方式使用，研究表明布比卡因的一个对映体左旋布比卡因 (levobupivacaine)，具有更低的心脏毒性，因此要比消旋体更安全。以天然氨基酸 L-赖氨酸为原料合成左旋布比卡因。

L-Lysine hydrochloride

L-赖氨酸盐酸盐

1) **判断** L-赖氨酸盐酸盐中手性中心的绝对构型，依据取代基的大小优先顺序确定你的答案，并将 1、2、3、以及 4 填入相应的空格中。

绝对构型：

Priority 从大到小的优先顺序 1 > 2 > 3 > 4:

Configuration:

☐ R

☐ S

2) L-赖氨酸的前缀 L 是指相对构型。以下表述准确的是：

- ☐ 所有天然 L-氨基酸都是左旋的。
- ☐ 天然 L-氨基酸可以是左旋的也可以是右旋的。
- ☐ 所有天然 L-氨基酸都是 S 构型的。
- ☐ 所有天然 L-氨基酸都是 R 构型的。

我们常希望只用 L-赖氨酸中的一个氨基参与反应。碱性的 Cu^{2+} 盐水溶液可以选择性地使其中一个氨基不参与反应。这个配合物一旦形成后，只有没有配位的氨基会参与后续反应。

3) 基于 L-赖氨酸是一个双齿配体，在碱性溶液中，两分子的 L-赖氨酸与一个 Cu^{2+} 配位，**画出**此配合物的结构式。

幸运的是，在下图所示的 levobupivacaine 合成路线中，即使没有 Cu^{2+} 盐参与，也是同一个氨基参与后续反应：

dilute: 稀; aqueous buffer: 缓冲水溶液; reagent: 试剂; reactive intermediate: 反应中间体

在画答案的结构式时,你也可以使用上图中所示的缩写。

4) **画出**化合物 **A** 的结构式,必须画出准确的立体构型。

5) L-赖氨酸转化为 **A** 的反应属于(**选择**正确的答案):

- ☐ 一个对映选择性反应。
- ☐ 一个非对映选择性反应。
- ☐ 一个区域选择性反应。

6) **画出**化合物 **B-F** 的结构式,必须画出准确的立体构型。

B $C_{14}H_{20}N_2O_4$; **C** $C_{16}H_{21}NO_6$; **D**; **E** $C_{29}H_{34}N_2O_6S$; **F** $C_{21}H_{28}N_2O_4S$

7) 在化合物 **C** 转化为 **D** 中 DCC 的作用是:

- ☐ 氨基的保护基。
- ☐ 羟基的保护基。
- ☐ 酰胺基形成的活化剂。

8) 在合成中,利用 TsCl 可以促成:

- ☐ 氨基的亲核取代反应。
- ☐ 氨基的亲电取代反应。
- ☐ 羟基的亲核取代反应。
- ☐ 羟基的亲电取代反应。

9) 试剂 **H** 可以是以下哪些试剂:

- ☐ 稀 HCl
- ☐ Zn/HCl
- ☐ K_2CO_3
- ☐ H_2SO_4
- ☐ 稀 $KMnO_4$
- ☐ 稀 NaOH
- ☐ $SOCl_2$
- ☐ PCl_5

10) **画出**左旋布比卡因 $C_{18}H_{28}N_2O$ 的结构式,必须画出准确的立体构型。

第 II 部分

左旋布比卡因的合成须以对映体纯的 L-赖氨酸为原料。确定氨基酸的光学活性纯度的常用方法是将其与 Mosher 酸反应转化为酰胺(下图为(S)-Mosher 酸的立体结构)。

11) **画出** L-赖氨酸中的 α -氨基与(S)-Mosher 酸反应转化为酰胺的结构式;清楚表明每一个手性中心的立体构型。

12) 外消旋的赖氨酸与(S)-Mosher 酸反应可以生成多少个产物(假定赖氨酸中只有 α -氨基能被衍生化)?

- ☐ 两个非对映异构体。
- ☐ 四个非对映异构体。
- ☐ 两个对映异构体的消旋混合物。
- ☐ 四个化合物: 两个对映异构体, 两个非对映异构体。

13) 在赖氨酸与(S)-Mosher 酸衍生化反应后,可以用于定量确定赖氨酸对映体纯度的方法是:

- ☐ NMR 谱图
- ☐ 液相色谱
- ☐ 质谱
- ☐ UV-vis 紫外可见吸收光谱